

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-5-12-67 721054

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

11, Rue de la Vigilance — 69 - LYON 3^e

Tél. 60-66-24 et 60-69-55

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F

C. C. P. LYON 9431-17

Régisseur Avances et Recettes D. D. A.
51, Av. Maréchal-Foch - LYON 6^e

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

Bulletin N° 86 de novembre 1967

29 novembre 1967

page 34

ABONNEMENTS

Nous invitons instamment nos abonnés à renouveler leur abonnement le plus rapidement possible, afin d'éviter les habituels "embouteillages" de début d'année.

Nous rappelons les tarifs:

- a) abonnement ordinaire (bulletin technique et Phytoma): 25F.
- b) abonnement à une même adresse à 1ex. de Phytoma et plusieurs exemplaires du bulletin: 25F. + 10F. par bulletin servi régulièrement en plus du premier
- c) abonnements collectifs groupés (1ex. du bulletin et de Phytoma par enveloppe) réservés aux organisations agricoles: 25F. pour l'abonnement au siège + 20F. par adhérent abonné.

Le règlement doit se faire par virement postal au:

C.C.P. 9431-17

Régisseur d'Avances et de Recettes de la D.D.A.

51 Avenue Maréchal Foch, LYON

en précisant bien au verso "abonnement avertissements agricoles". Mentionner nom et adresse de l'abonné en caractères d'imprimerie.

INFORMATIONS

LE CHARBON DU MAIS

Cette maladie qui transforme l'épi, à divers stades de son développement, en sac bourré de la poussière brun-noir des spores, a sensiblement progressé dans la région depuis 2 ans.

La lutte est rendue difficile par l'étalement des attaques au cours de la végétation et par la survivance prolongée des spores dans le sol.

La désinfection des semences, nécessaire, n'est toutefois pas suffisante pour protéger le végétal pendant toute une saison. Deux autres mesures s'imposent:

- destruction par le feu le plus tôt possible des épis charbonneux
- rotation afin d'éviter de remettre du maïs sur un champ venant de porter du maïs charbonneux

Enfin nous rappelons qu'en raison de la forte toxicité des parties charbonneuses, il convient d'éviter le plus possible de laisser des épis malades dans la nourriture du bétail, notamment des vaches en gestation, le charbon provoquant très couramment des avortements.

STADES VEGETATIFS

Au verso de ce bulletin, nous publions le tableau des étapes de développement des bourgeons du poirier, d'après l'échelle de Mr. Fleckinger. Les stades végétatifs du pommier seront publiés par la suite.

Le bulletin faisant souvent référence à ces stades en cours de campagne, nous conseillons vivement à nos abonnés de conserver ces bulletins.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux
A. PITHIQUOT

Le Contrôleur chargé des
Avertissements agricoles
P. LATARD

724

DEVELOPPEMENT DES ORGANES DE FRUCTIFICATION DES ARBRES FRUITIERS

Tableau n° 1 — STADES-REPÈRES DU POIRIER

bourgeon proprement dit

bouton de la fleur

fleur

ovaire et fruit

